

CRITÉRIOS BÁSICOS PARA DOAÇÃO DE SANGUE

O QUE É PRECISO PARA DOAR SANGUE

- Apresentar documento oficial com foto
- Estar em boas condições de saúde, não estar gripado ou com outra infecção
- Estar descansado e alimentado
- Ter entre 16 e 69 anos de idade
- O limite de idade para a primeira doação é de 60 anos, 11 meses e 29 dias
- Menores entre 16 e 17 anos de idade podem doar com acompanhamento e autorização do responsável legal
- Pesar no mínimo 55 kg

QUEM NÃO PODE DOAR SANGUE

- Quem teve Hepatite após 11 anos de idade
- Doença de Chagas, Câncer, Sífilis
- Pessoas infectadas pelo HIV e seus parceiros
- Homens e mulheres com parceiro(a) eventual ou múltiplos parceiros sexuais, que mantêm relações com ou sem o uso de preservativo
- Pessoas que compartilham seringas
- Pessoas que fazem uso de drogas injetáveis ilícitas

DEVE AGUARDAR PARA DOAR SANGUE

- Quem fez transfusão de sangue.....1 ano
- Tatuagem, maquiagem definitiva, piercing..... 1 ano
- Piercing (oral e genital).....1 ano da retirada
- Quem se submeteu a cirurgias (e parceiro).....será analisado
- Parto normal.....3 meses
- Amamentação.....parto ocorrido há mais de 1 ano
- Dengue clássica1 mês após a cura
- Dengue grave.....6 meses após cura
- Doença sexualmente transmissível-DST1 ano após cura (exceto sífilis)
- Gripe (após o término dos sintomas).....2 semanas
- Medicação.....à critério médico
- Procedimentos endoscópicos (Endoscopia/Colonoscopia).....6 meses

APÓS VACINAÇÃO AGUARDAR

Antirábica (após a mordedura)	1 ano
Antitetânica / Antirábica (preventiva)	48 horas
Rubéola / Sarampo / Varicela / BCG / Febre amarela/Dengue	1 mês
Gripe (Influenza) / Hepatite A e B / HPV	48 horas
Covid-19 – Coronovac (Sinovac/Butatan)	48 horas
Covid-19 – BNT 162 (BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer)	7 dias
Covid-19 – Covishield (Astrazeneca/Oxford/Fiocruz)	7 dias
Covid-19 – AD26.Cov2.S (Janssen-Cilag) *22	7 dias*22

ATENÇÃO:

Viagem para outros Estados e/ou Países poderá inaptar a doação por 30 dias ou mais. Este critério será analisado durante a Triagem Clínica (entrevista).

INTERVALO ENTRE DOAÇÕES

HOMENS..... 60 dias – Máximo 4 vezes no período de 12 meses
MULHERES..... 90 dias – Máximo 3 vezes no período de 12 meses

Apesar da realização de vários testes com o sangue doado, antes de sua liberação para outras pessoas, não existe 100% de segurança para o paciente/receptor, pois há um período chamado janela imunológica, que é o tempo entre a contaminação por agentes infecciosos e a positividade do teste. Por isso são muito importantes as respostas dadas durante a triagem clínica.

EXAMES REALIZADOS DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS PELO SANGUE:
Doença de Chagas, Hepatite B, Hepatite C, HIV I e II, HTLV e Sífilis.
OUTROS EXAMES: Tipagem Sangüínea e Hemoglobina S.

RECOMENDAÇÕES

- Não ingerir bebida alcoólica pelo menos 12 horas antes da doação (para quem bebe com moderação)
- Não fumar 1 hora antes e após a doação
- Estar bem alimentado antes da doação (não estar em jejum)
- Evitar alimentos gordurosos no dia anterior à doação
- Ingerir líquidos em maior quantidade antes e depois da doação (sugestão: 2 copos de água antes da doação)
- Doadores acompanhados de crianças menores de 12 anos não poderão doar sangue, exceto em casos de acompanhamento de outro responsável durante a doação